

1 Zum warm werden

a) $\frac{1}{2} + \frac{2}{3} - \frac{3}{4} - \frac{1}{6} = ?$

b) $\left(\sqrt[3]{2^2} \sqrt[4]{2^{-3}}\right)^{12} = ?$

c) $\log_7 49 = ?$

d) $\lg \frac{1}{10} = ?$

e) $\lg \sqrt[3]{1000} = ?$

f) $2^x = \frac{1}{8} ; x = ?$

2 Abschnittsweise definierte Funktionen

Skizzieren Sie die Graphen dieser abschnittsweise definierten Funktionen. Geben Sie die Wertemenge an.

a) $f(x) = \begin{cases} x+2 & \text{für } x < 0 \\ 2 & \text{für } 0 \leq x < 2 \\ \frac{x^2}{2} & \text{für } x \geq 2 \end{cases}$

b) $g(x) = \begin{cases} |-x-1| & \text{für } x \leq 0 \\ \cos(\pi x) & \text{für } x > 0 \end{cases}$

3 Ein Dreizeiler

Die beiden Vororte X und Y einer Stadt bilden mit deren Zentrum in Z ein Dreieck. Von X über Z nach Y beträgt die Entfernung 12 km. Wir wissen, Y liegt 2 km weiter vom Zentrum entfernt als X. Wie weit sind beide Orte vom Zentrum entfernt?

4 Zusammengesetzte und verkettete Funktionen

(i) Berechnen Sie für folgende Funktionen f, g jeweils die Abbildungsvorschriften von $f+g, f-g, f \cdot g, \frac{f}{g}$. Bestimmen Sie jeweils auch den maximalen Definitionsbereich.

a) $f(x) = x - 2; g(x) = 1 - 2x$

b) $f(x) = \sin(x); g(x) = \cos(x)$

(ii) Bestimmen Sie geeignete Funktionen f und g , für die $h = g \circ f$ gilt.

a) $h(x) = \ln(x+1)$

b) $h(x) = \left(\frac{x+2}{x+1}\right)^2$

c) $h(x) = \cos^2(x)$

(iii) Gegeben sind die Funktionen f, g, h mit

$$f(x) = x^2, \quad g(x) = \sqrt{x}, \quad h(x) = \frac{1}{x}$$

Bestimmen Sie die Abbildungsterme folgender Funktionen. Vereinfachen Sie die Funktionsterme weitmöglichst. Wie groß ist jeweils der maximale Definitionsbereich?

a) $g \circ f$ und $f \circ g$

b) $f \circ (g+h)$

c) $h \circ (f \cdot g)$

d) $f \circ (g \circ h)$

5 Kurvendiskussion

(i) Skizzieren Sie die Graphen folgender Funktionen ohne Taschenrechner. Bestimmen Sie die Wertemenge.

a) $y = e^x$ & $y = e^{-x}$

c) $y = x + |x - 1|$

b) $y = |\sin(x)|$

d) $y = e^{\cos(x)}$

(ii) Untersuchen Sie folgenden Funktionen auf Periodizität und Beschränktheit.

a) $\frac{5}{6} \sin(7x + 8)$

b) $\frac{1}{4 + \sin(x)}$

(iii) Zusatz: Bestimmen Sie alle Nullstellen, Minima, Maxima und Wendepunkte der Funktion

$$f(x) = x^3 - 39x - 70$$

und skizzieren Sie diese. Hinweis, eine Nustelle kann man schnell erraten.

6 Abkühlungskurve

Ein Körper mit der Temperatur $T(t)$ und der Anfangstemperatur T_0 wird durch Luft mit der konstanten Temperatur T_1 gekühlt. Der Temperaturabnahme verläuft dabei exponentiell nach der Gleichung

$$\Delta T(t) = \Delta T_0 e^{-kt} ,$$

mit der Temperaturdifferenz $\Delta T(t) = T(t) - T_1$ und der anfänglichen Temperaturdifferenz $\Delta T_0 = T_0 - T_1$.

In einem Versuch beträgt die Lufttemperatur 20°C . Nach 20 Minuten betrug die Temperatur des Körpers noch 80°C und nach 3 Stunden noch 30°C .

- Welche physikalische Einheit hat k ?
- Skizzieren Sie den Temperaturverlauf des Körpers und tragen Sie markante Punkte ein.
- Berechnen Sie die Anfangstemperatur des Körpers. Hinweis: Die beiden Zeitpunkte geben Ihnen zwei Gleichungen und Sie können dann ΔT_0 und k ausrechnen.
- Nach welcher Zeit ist der Körper auf 25°C abgekühlt?

Viel Spaß beim Lösen. ☺